TRIMMIT™

PLANT GROWTH REGULATOR

SUSPENSION CONCENTRATE

COMMERCIAL

For Use on Turfgrass on Golf Courses

ACTIVE INGREDIENT:

Paclobutrazol 247 g/L

Contains 1,2-benzisothiazolin-3-one at 0.0017% as a preservative.

**READ THE LABEL AND BOOKLET BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

NET CONTENTS: **0.5 L – bulk**

REGISTRATION NUMBER: **35063**
PEST CONTROL PRODUCTS ACT

Syngenta Canada Inc.
140 Research Lane, Research Park
Guelph, Ontario N1G 4Z3
Telephone: 1-877-964-3682

Label

1.0 NOTICE TO USER

This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.

2.0 FIRST AID

IN CASE OF POISONING, contact a physician or a poison control centre **IMMEDIATELY**. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

If swallowed, call a poison control centre or doctor **IMMEDIATELY** for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If in eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

If on skin or clothing, take off contaminated clothing. Rinse skin **IMMEDIATELY** with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

If inhaled, move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.

3.0 TOXICOLOGICAL INFORMATION

Perform gastric lavage taking care to prevent aspiration of gastric contents. Then treat symptomatically.

4.0 PRECAUTIONS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND ANIMALS.

Restricted Entry Intervals (REI): DO NOT enter or allow entry into treated areas until sprays have dried.

Avoid breathing and working in spray mist. Avoid all drift or contact with other vegetation.

DO NOT apply to turf in residential areas, including lawns, gardens, parks, playing fields, cemeteries and schools. TRIMMIT™ can be applied to golf course greens, tees, and fairways only.

DO NOT use or store near heat or open flame. **DO NOT** apply beyond the field boundary.

DO NOT apply by air.

5.0 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

Wear a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes during mixing, loading, application, clean-up and repair. Gloves are not required during application within a closed cab.

After spraying, wash hands and shower thoroughly with soap and water. Discard clothing and other absorbent materials that have been drenched or heavily contaminated with this product. Do not reuse them. Wear freshly laundered clothes daily. Do not wear contaminated shoes.

Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for washables exist, use detergent and hot water. Store and wash all protective clothing separately from household laundry.

While using product, do not eat, drink or use tobacco (including smoking). Thoroughly wash hands and exposed skin with soap and water before eating, drinking, using tobacco, applying cosmetics, or using the toilet.

6.0 ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS

TOXIC to aquatic organisms and non-target terrestrial plants. Observe spray buffer zones specified under DIRECTIONS FOR USE.

This product demonstrates the properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this product in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination.

To reduce runoff from treated areas into aquatic habitats avoid application to areas with a moderate to steep slope, compacted soil, or clay.

Avoid application when heavy rain is forecast.

Contamination of aquatic areas as a result of runoff may be reduced by including a vegetative filter strip between the treated area and the edge of the water body.

7.0 STORAGE

Store this product away from food or feed. Always store in original container with top closed in a cool, dry place. If frozen, allow to thaw and then mix product thoroughly prior to use. Do not use or store near heat or open flame.

8.0 DISPOSAL

For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

For Recyclable Containers

DO NOT reuse this container for any purpose. This is a recyclable container, and is to be disposed of at a container collection site. Contact your local distributor/dealer or municipality for the location of the nearest collection site. Before taking the container to the collection site:

1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the tank.
2. Make the empty, rinsed container unsuitable for further use.

If there is no container collection site in your area, dispose of the container in accordance with provincial requirements.

For Refillable Containers

For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer). It must be refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not reuse this container for any other purpose.

***IN CASE OF EMERGENCY INVOLVING A MAJOR SPILL, FIRE OR POISONING,
CALL 1-800-327-8633 (FASTMED)***

TRIMMIT™ is a trademark of a Syngenta Group Company.

TRIMMIT™

PLANT GROWTH REGULATOR

SUSPENSION CONCENTRATE

COMMERCIAL

For Use on Turfgrass on Golf Courses

ACTIVE INGREDIENT:

Paclobutrazol 247 g/L

Contains 1,2-benzisothiazolin-3-one at 0.0017% as a preservative.

**READ THE LABEL AND BOOKLET BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

REGISTRATION NUMBER: **35063**
PEST CONTROL PRODUCTS ACT

Syngenta Canada Inc.
140 Research Lane, Research Park
Guelph, Ontario N1G 4Z3
Telephone: 1-877-964-3682

Pamphlet

Table of Contents

	<u>Section Number</u>
NOTICE TO USER.....	1.0
FIRST AID	2.0
TOXICOLOGICAL INFORMATION.....	3.0
PRECAUTIONS	4.0
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE).....	5.0
ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS	6.0
STORAGE	7.0
DISPOSAL	8.0
PRODUCT INFORMATION	9.0
DIRECTIONS FOR USE	10.0
General Information	10.1
Ground Application.....	10.2
General Information	10.2.1
Mixing Instructions	10.2.2
Spraying Instructions	10.2.3
Equipment Clean-Up.....	10.2.4
Spray Buffer Zones	10.3
CROP USE DIRECTIONS	11.0
Turf – Golf Course Fairways, Greens and Tees.....	11.1

1.0 NOTICE TO USER

This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.

2.0 FIRST AID

IN CASE OF POISONING, contact a physician or a poison control centre **IMMEDIATELY**. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

If swallowed, call a poison control centre or doctor **IMMEDIATELY** for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If in eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

If on skin or clothing, take off contaminated clothing. Rinse skin **IMMEDIATELY** with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

If inhaled, move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.

3.0 TOXICOLOGICAL INFORMATION

Perform gastric lavage taking care to prevent aspiration of gastric contents. Then treat symptomatically.

4.0 PRECAUTIONS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND ANIMALS.

Restricted Entry Intervals (REI): DO NOT enter or allow entry into treated areas until sprays have dried.

Avoid breathing and working in spray mist. Avoid all drift or contact with other vegetation.

DO NOT apply to turf in residential areas, including lawns, gardens, parks, playing fields, cemeteries and schools. TRIMMIT™ can be applied to golf course greens, tees, and fairways only.

DO NOT use or store near heat or open flame. **DO NOT** apply beyond the field boundary.

DO NOT apply by air.

5.0 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

Wear a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes during mixing, loading, application, clean-up and repair. Gloves are not required during application within a closed cab.

After spraying, wash hands and shower thoroughly with soap and water. Discard clothing and other absorbent materials that have been drenched or heavily contaminated with this product. Do not reuse them. Wear freshly laundered clothes daily. Do not wear contaminated shoes.

Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for washables exist, use detergent and hot water. Store and wash all protective clothing separately from household laundry.

While using product, do not eat, drink or use tobacco (including smoking). Thoroughly wash hands and exposed skin with soap and water before eating, drinking, using tobacco, applying cosmetics, or using the toilet.

6.0 ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS

TOXIC to aquatic organisms and non-target terrestrial plants. Observe spray buffer zones specified under DIRECTIONS FOR USE.

This product demonstrates the properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this product in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination.

To reduce runoff from treated areas into aquatic habitats avoid application to areas with a moderate to steep slope, compacted soil, or clay.

Avoid application when heavy rain is forecast.

Contamination of aquatic areas as a result of runoff may be reduced by including a vegetative filter strip between the treated area and the edge of the water body.

7.0 STORAGE

Store this product away from food or feed. Always store in original container with top closed in a cool, dry place. If frozen, allow to thaw and mix product thoroughly prior to use. Do not use or store near heat or open flame.

8.0 DISPOSAL

For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

For Recyclable Containers

DO NOT reuse this container for any purpose. This is a recyclable container, and is to be disposed of at a container collection site. Contact your local distributor/dealer or municipality for the location of the nearest collection site. Before taking the container to the collection site:

1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the tank.
2. Make the empty, rinsed container unsuitable for further use.

If there is no container collection site in your area, dispose of the container in accordance with provincial requirements.

For Refillable Containers

For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer). It must be refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not reuse this container for any other purpose.

***IN CASE OF EMERGENCY INVOLVING A MAJOR SPILL, FIRE OR POISONING,
CALL 1-800-327-8633 (FASTMED)***

9.0 PRODUCT INFORMATION

TRIMMIT is a plant growth regulator for non-residential turfgrass that slows grass growth for up to two months after application. The frequency of mowing can be reduced by up to 50% during the period of effective retardation. Use of TRIMMIT on fine turf should be accompanied by moderate-to-high fertility to maintain turfgrass appearance and reduce discoloration. Growth and development of some grasses (e.g. *Poa annua*) can be significantly reduced, leading to selective control after prolonged use in mixed turfgrass populations.

10.0 DIRECTIONS FOR USE

10.1 General Information

As this product is not registered for the control of pests in aquatic systems, **DO NOT** use to control aquatic pests.

DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.

This product may be tank mixed with a fertilizer, a supplement, or with registered pest control

products, whose labels also allow tank mixing, provided the entirety of both labels, including Directions For Use, Precautions, Restrictions, Environmental Precautions, and Spray Buffer Zones are followed for each product. In cases where these requirements differ between the tank mix partner labels, the most restrictive label must be followed. Do not tank mix products containing the same active ingredient unless specifically listed on this label.

In some cases, tank mixing pest control products can result in reduced pesticide efficacy or increased host crop injury. The user should contact Syngenta Canada Inc. at 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682) for information before applying any tank mix that is not specifically recommended on this label.

Syngenta Canada Inc. has not fully assessed performance (efficacy) and/or crop tolerance (phytotoxicity) of all potential tank-mixes under all environmental conditions or for all crop varieties. Tank mixes that are not specifically listed on this label should be tested on a small area first, under local conditions and using standard practices, to confirm the tank mix is suitable for widespread application.

To determine the physical compatibility of this product with other products, use a jar test.

Always read and follow label directions including WALES mixing order.

10.2 Ground Application

10.2.1 General Information

Apply only when the potential for drift beyond the area to be treated is minimal. Take into consideration wind speed, wind direction, temperature inversions, application equipment, and sprayer settings.

For the protection of non-target habitats, over-spray or drift to any body of water or other environmentally sensitive habitats must be avoided. The interaction of many equipment and weather-related factors determines the potential for spray drift. The applicator is responsible for considering all these factors when making application decisions.

Field sprayer application: **DO NOT** apply during periods of dead calm. Avoid application of this product when winds are gusty. **DO NOT** apply with spray droplets smaller than the American Society of Agricultural Engineers (ASAE S572.1) medium classification. Boom height must be 60 cm or less above the crop or ground.

Ground spraying may be done with any standard boom sprayer.

DO NOT apply by air.

10.2.2 Mixing Instructions

1. Ensure that the sprayer interior is clean, then fill the spray tank with ½ the required amount of water and engage gentle agitation. Good agitation is indicated by a rippling or rolling action on the surface of the water.
2. Add TRIMMIT and agitate to ensure complete mixing.

3. Finish filling the sprayer with water, maintaining good agitation.
4. After any break in spraying operations, agitate thoroughly before spraying again.
5. Spray the same day as mixing.
6. Do not mix, load or clean spray equipment where there is a potential to contaminate wells or aquatic systems.

When using chemical handling equipment to fill the sprayer, the following additional recommendations apply:

- SC, formulations may be inducted or batch mixed.
-

10.2.3 Spraying Instructions

1. Water Volume: Apply in sufficient water to ensure thorough coverage; 400-800 L/ha is recommended.
2. Sprayer Agitation: Use a jet agitator or liquid sparge tub which recirculates 10% or more of the tank per minute. **DO NOT** use an air sparger.
3. Pump: Screens should be used to protect the pump and prevent clogging. Use 16 mesh or *coarser* screens on the suction side of the pump. **DO NOT** place a screen in the recirculation line. Use 50 mesh or *coarser* screens between the pump and boom unless directed otherwise by the sprayer manufacturer.
4. Spray Nozzles: 80° or 110° drift reducing flat fan (e.g. those with a pre-orifice or turbulence chamber) or air induction nozzles are recommended. Use 50 mesh nozzle screens. **DO NOT** use flood type nozzles, controlled droplet application equipment, spray foils or hollow cone nozzles.
5. Pressure: As recommended by the nozzle manufacturer to achieve ASAE medium sized droplets.
6. Apply at uniform speed and avoid overlapping. Shut off spray boom while starting, turning, slowing or stopping to avoid potential crop injury from over application.

10.2.4 Equipment Clean-Up

Before Spraying:

- Prior to using TRIMMIT, ensure that the spray tank, lines and filter are thoroughly clean.

After Spraying:

- To avoid subsequent injury to other crops, thoroughly clean application equipment immediately after spraying each day.
- Ensure that all traces of the product are removed. **DO NOT** allow residue to dry in spray tank. **DO NOT** allow solution to remain in lines or tank overnight. The following procedures are recommended:
 1. Drain and flush tank, boom and all hoses for several minutes with clean water. Ensure dead end lines are flushed. **Do not** clean the sprayer near desirable vegetation, wells or other water sources.
 2. Use a pressure washer to clean the inside of the spray tank. Take care to wash all parts of the tank, including the inside top surface. If a pressure washer is not available, completely fill the sprayer with the cleaning solution to ensure contact of the cleaning solution with all internal surfaces of the tank and plumbing. Start agitation in the sprayer and thoroughly recirculate the cleaning solution for at least 15 minutes. All visible deposits must be removed from the spraying system.

3. Flush hoses, spray lines, and nozzles for at least 1 minute with the cleaning solution.
4. Dispose of all rinsings in accordance with provincial regulations.
5. Repeat steps 2-5.
6. Remove nozzles, screens, and strainers and clean separately in the ammonia solution after completing the above procedures.
7. Rinse the complete spraying system with clean water.

10.3 Spray Buffer Zones

A spray buffer zone is NOT required for uses with hand-held application equipment permitted on this label.

The spray buffer zones specified in the table below are required between the point of direct application and the closest downwind edge of sensitive terrestrial habitats (such as grasslands, forested areas, shelter belts, woodlots, hedgerows, riparian areas and shrublands) and sensitive freshwater habitats (such as lakes, rivers, sloughs, ponds, prairie potholes, creeks, marshes, streams, reservoirs and wetlands).

Method of application	Crop	Spray Buffer Zones (metres) Required for the Protection of:				
		Freshwater Habitat of Depths:		Estuarine/Marine Habitat of Depths:		Terrestrial Habitat:
		Less than 1 m	Greater than 1 m	Less than 1 m	Greater than 1 m	
Field sprayer	Turf – Golf Course Fairways, Greens and Tees	2	1	0	0	5

When tank mixes are permitted, consult the labels of the tank-mix partners and observe the largest (most restrictive) spray buffer zone of the products involved in the tank mixture and apply using the coarsest spray (ASAE) category indicated on the labels for those tank mix partners.

The spray buffer zones for this product can be modified based on weather conditions and spray equipment configuration by accessing the Spray Buffer Zone Calculator on the Pesticides portion of the Canada.ca website.

11.0 CROP USE DIRECTIONS

11.1 Turf – Golf Course Fairways, Greens and Tees

TURF – Golf course fairways, greens and tees	
USES	Reduces the frequency of mowing up to 50% by regulating the growth of turfgrass. Suppression of <i>Poa annua</i>
APPLICATION RATE	For single application, apply at 0.45 – 1.12 L/ha. Use lower rate and more frequent applications if turf discoloration cannot be tolerated. For multiple applications, do not apply more than 4.05 L/ha per year.

APPLICATION INTERVAL	To maintain high quality turf, repeat applications are recommended with a 7-21 day interval. Repeat application can be made within the same growing season as long as the turf is actively growing.
NOTES	<p>Assure that dosage rates are measured accurately since rates greater than those recommended may cause undesirable turf growth control and may discolor areas temporarily.</p> <p>Apply in sufficient water to ensure thorough coverage. 400-800 L/ha is recommended.</p> <p>For best results, water in TRIMMIT, but not to the point of runoff, prior to rain or within 24 hours to limit surface movement. To prevent product runoff, time applications to allow for watering-in and maximum absorption into treated turf prior to a rain event.</p> <p>For best residual activity, TRIMMIT should be removed from leaf surfaces by irrigation or rainfall prior to mowing.</p> <p>Withhold application on large turf areas that have been thinned from winter drainage, disease, or insects until desired fill-in is achieved.</p> <p>Delay treatment of newly-sodded or sprigged turf until grass has knitted down and rooted firmly.</p> <p>Do not apply product when soil is already saturated. Heavy rainfall or irrigation in the treated areas may cause active ingredient to move laterally on slopes and collect in low areas. These areas may undergo more severe growth control for a longer period of time.</p> <p>When to Use for Growth Suppression of Cool-Season Grasses: Apply in spring after green-up and after turf has been mowed once or twice. Apply at least 1 month before onset of high air temperatures. In late summer/early fall, apply at least 1 month before anticipated first killing frost. Repeat applications can be made within the same growing season as long as the turf is actively growing. Turfgrass species and growth rate will dictate rate and timing of applications. Do not seed within 6 weeks prior to or 2 weeks after application of TRIMMIT.</p> <p>When to Use for <i>Poa annua</i> Suppression: Apply when the <i>Poa annua</i> is actively growing. In climates with a prolonged winter dormancy, fall applications can be made up to one month prior to anticipated first killing frost. Repeat application should be made as part of a <i>Poa annua</i> suppression program. TRIMMIT will suppress the growth and competitive ability of <i>Poa annua</i>. Lower rates and more frequent applications can be made if <i>Poa annua</i> discoloration cannot be tolerated, however, only moderate <i>Poa annua</i> suppression may be achieved.</p> <p>Do not use on areas containing greater than 70% <i>Poa annua</i>, since discoloration of <i>Poa annua</i> may be unacceptable.</p>

For further information or to report suspected resistance, contact company representatives at 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682) or at www.syngenta.ca.

TRIMMIT™ is a trademark of a Syngenta Group Company.

TRIMMIT^{MC}

RÉGULATEUR DE CROISSANCE DES PLANTES

CONCENTRÉ EN SUSPENSION

COMMERCIAL

Pour utilisation sur le gazon des terrains de golf

PRINCIPE ACTIF :

Paclobutrazol 247 g/L

Contient de la 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,0017 % à titre d'agent de conservation.

**LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

CONTENU NET : **0,5 L à vrac**

N^o D'HOMOLOGATION: **35063**

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Syngenta Canada inc.

140 Research Lane, Research Park

Guelph, Ontario N1G 4Z3

Téléphone : 1-877-964-3682

Label

1.0 AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

2.0 PREMIERS SOINS

EN CAS D'EMPOISONNEMENT, consulter **IMMÉDIATEMENT** un médecin ou un centre antipoison. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin **IMMÉDIATEMENT** pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer **IMMÉDIATEMENT** la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence la bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

3.0 RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Effectuer un lavage gastrique en prenant soin d'éviter toute aspiration du contenu gastrique. Administrer un traitement symptomatique.

4.0 MISES EN GARDE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.

Délai de sécurité (DS) : NE PAS pénétrer ni permettre l'accès des zones traitées avant que les bouillies de pulvérisation ne soient sèches.

Éviter d'inhaler et de travailler dans le brouillard de pulvérisation. Éviter toute dérive ou tout contact avec d'autres végétaux.

NE PAS appliquer sur le gazon dans les zones résidentielles, y compris les pelouses, les jardins, les parcs, les terrains de jeux, les cimetières et les écoles. TRIMMIT^{MC} peut être appliqué uniquement sur les verts, les tertres de départ et les allées.

NE PAS utiliser ni entreposer ce produit près d'une source de chaleur ou de flammes nues. **NE PAS** appliquer au-delà du champ à traiter.

NE PAS appliquer par voie aérienne.

5.0 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)

Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et les réparations. Les gants ne sont pas requis à l'intérieur de la cabine fermée pendant l'application.

Après la pulvérisation, se laver les mains et se doucher avec de l'eau et du savon. Jeter les vêtements et autres matériaux absorbants qui ont été imbibés de ce produit ou fortement contaminés par celui-ci. Ne pas les réutiliser. Porter des vêtements fraîchement lavés tous les jours. Ne pas porter de chaussures contaminées.

Suivre les directives du fabricant pour le nettoyage et l'entretien de l'ÉPI. Si aucune directive n'est donnée pour les articles lavables, utiliser de l'eau chaude et un détergent. Laver et ranger tous les vêtements de protection séparément des autres vêtements de la maison.

Ne pas manger, boire ou utiliser du tabac (y compris fumer) en utilisant ce produit. Bien se laver les mains et les régions de la peau exposées avec de l'eau et du savon avant de manger, de boire, d'utiliser des produits du tabac, d'appliquer des produits cosmétiques ou d'aller aux toilettes.

6.0 MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES

TOXIQUE pour les organismes aquatiques et les plantes terrestres non ciblées. Observer les zones tampons de pulvérisation spécifiées à la section MODE D'EMPLOI.

Ce produit démontre les propriétés et les caractéristiques associées à des produits chimiques détectés dans les eaux souterraines. L'utilisation de ce produit dans les zones où les sols sont perméables, en particulier lorsque la nappe phréatique est peu profonde, peut entraîner la contamination des eaux souterraines.

Afin de réduire le ruissellement à partir des sites traités vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compacté ou sur de l'argile.

Éviter d'appliquer ce produit lorsqu'une forte pluie est prévue.

La contamination des habitats aquatiques par ruissellement peut être réduite par l'aménagement d'une bande de végétation filtrante entre le site traité et le bord du plan d'eau.

7.0 ENTREPOSAGE

Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Toujours entreposer dans le contenant d'origine fermé, dans un endroit frais et sec. Si le produit est gelé, le laisser dégeler et bien l'agiter avant de l'utiliser. Ne pas utiliser ni entreposer ce produit près d'une source de chaleur ou de flammes nues.

8.0 ÉLIMINATION

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

Contenants recyclables

NE PAS utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Contenants à remplissages multiples

En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins.

***EN CAS D'URGENCE CONCERNANT UN DÉVERSEMENT D'IMPORTANCE, UN INCENDIE
OU UN EMPOISONNEMENT, COMPOSER LE 1-800-327-8633 (FASTMED)***

TRIMMIT^{MC} est une marque de commerce d'une compagnie du groupe Syngenta.

TRIMMIT^{MC}

RÉGULATEUR DE CROISSANCE DES PLANTES

CONCENTRÉ EN SUSPENSION

COMMERCIAL

Paclobutrazol 247 g/L

PRINCIPE ACTIF :

Paclobutrazol 250 g de m.a./L

Contient de la 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,0017 % à titre d'agent de conservation.

**LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

N^o D'HOMOLOGATION: **35063**

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Syngenta Canada inc.

140 Research Lane, Research Park

Guelph, Ontario N1G 4Z3

Téléphone : 1-877-964-3682

Pamphlet

Table des matières

	<u>Numéro de section</u>
AVIS À L'UTILISATEUR	1.0
PREMIERS SOINS	2.0
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES	3.0
MISES EN GARDE	4.0
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)	5.0
MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES.....	6.0
ENTREPOSAGE.....	7.0
ÉLIMINATION	8.0
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT	9.0
MODE D'EMPLOI.....	10.0
Renseignements généraux	10.1
Application par voie terrestre	10.2
Renseignements généraux	10.2.1
Directives relatives au mélange	10.2.2
Directives relatives à la pulvérisation.....	10.2.3
Nettoyage de l'équipement	10.2.4
Zones tampons de pulvérisation.....	10.3
MODES D'EMPLOI SPÉCIFIQUES AUX CULTURES	11.0
Gazon – allées, verts et tertres de départ des terrains de golf	11.1

1.0 AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

2.0 PREMIERS SOINS

EN CAS D'EMPOISONNEMENT, consulter **IMMÉDIATEMENT** un médecin ou un centre antipoison. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin **IMMÉDIATEMENT** pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer **IMMÉDIATEMENT** la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence la bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

3.0 RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Effectuer un lavage gastrique en prenant soin d'éviter toute aspiration du contenu gastrique. Administrer un traitement symptomatique.

4.0 MISES EN GARDE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.

Délai de sécurité (DS) : NE PAS pénétrer ni permettre l'accès des zones traitées avant que les bouillies de pulvérisation ne soient sèches.

Éviter d'inhaler et de travailler dans le brouillard de pulvérisation. Éviter toute dérive ou tout contact avec d'autres végétaux.

NE PAS appliquer sur le gazon dans les zones résidentielles, y compris les pelouses, les jardins, les parcs, les terrains de jeux, les cimetières et les écoles. TRIMMIT^{MC} peut être appliqué uniquement sur les verts, les tertres de départ et les allées.

NE PAS utiliser ni entreposer ce produit près d'une source de chaleur ou de flammes nues. **NE PAS** appliquer au-delà du champ à traiter.

NE PAS appliquer par voie aérienne.

5.0 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)

Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et les réparations. Les gants ne sont pas requis à l'intérieur de la cabine fermée pendant l'application.

Après la pulvérisation, se laver les mains et se doucher avec de l'eau et du savon. Jeter les vêtements et autres matériaux absorbants qui ont été imbibés de ce produit ou fortement contaminés par celui-ci. Ne pas les réutiliser. Porter des vêtements fraîchement lavés tous les jours. Ne pas porter de chaussures contaminées.

Suivre les directives du fabricant pour le nettoyage et l'entretien de l'ÉPI. Si aucune directive n'est donnée pour les articles lavables, utiliser de l'eau chaude et un détergent. Laver et ranger tous les vêtements de protection séparément des autres vêtements de la maison.

Ne pas manger, boire ou utiliser du tabac (y compris fumer) en utilisant ce produit. Bien se laver les mains et les régions de la peau exposées avec de l'eau et du savon avant de manger, de boire, d'utiliser des produits du tabac, d'appliquer des produits cosmétiques ou d'aller aux toilettes.

6.0 MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES

TOXIQUE pour les organismes aquatiques et les plantes terrestres non ciblées. Observer les zones tampons de pulvérisation spécifiées à la section MODE D'EMPLOI.

Ce produit démontre les propriétés et les caractéristiques associées à des produits chimiques détectés dans les eaux souterraines. L'utilisation de ce produit dans les zones où les sols sont perméables, en particulier lorsque la nappe phréatique est peu profonde, peut entraîner la contamination des eaux souterraines.

Afin de réduire le ruissellement à partir des sites traités vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compacté ou sur de l'argile.

Éviter d'appliquer ce produit lorsqu'une forte pluie est prévue.

La contamination des habitats aquatiques par ruissellement peut être réduite par l'aménagement d'une bande de végétation filtrante entre le site traité et le bord du plan d'eau.

7.0 ENTREPOSAGE

Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Toujours entreposer dans le contenant d'origine fermé, dans un endroit frais et sec. Si le produit est gelé, le laisser dégeler et bien l'agiter avant de l'utiliser. Ne pas utiliser ni entreposer ce produit près d'une source de chaleur ou de flammes nues.

8.0 ÉLIMINATION

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

Contenants recyclables

NE PAS utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Contenants à remplissages multiples

En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins.

EN CAS D'URGENCE CONCERNANT UN DÉVERSEMENT D'IMPORTANCE, UN INCENDIE OU UN EMPOISONNEMENT, COMPOSER LE 1-800-327-8633 (FASTMED).

9.0 RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

TRIMMIT est un régulateur de croissance pour le gazon non résidentiel qui ralentit la croissance des graminées jusqu'à deux mois après l'application. La fréquence de tonte peut être réduite jusqu'à 50 % pendant la période de régulation de la croissance. L'utilisation de TRIMMIT sur un gazon fin doit être accompagnée d'une fertilisation de modérée à élevée si l'on veut préserver l'aspect du gazon et réduire sa décoloration. La croissance et le développement de certaines graminées (p. ex. *Poa annua*) peuvent être significativement réduites, ce qui entraînera une suppression sélective après un usage prolongé sur des populations de gazon mixtes.

10.0 MODE D'EMPLOI

10.1 Renseignements généraux

Puisque ce produit n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques, **NE PAS** l'utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique.

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.

Ce produit peut être mélangé avec un engrais, un supplément ou avec des produits antiparasitaires homologués, dont les étiquettes permettent aussi les mélanges en cuve, à la condition que la totalité de chaque étiquette, y compris le mode d'emploi, les mises en garde, les restrictions, les précautions relatives à l'environnement et les zones tampons de pulvérisation, soit suivie pour chaque produit. Lorsque les renseignements inscrits sur les étiquettes des produits d'association au mélange en cuve divergent, il faut suivre le mode d'emploi le plus restrictif. Ne pas faire de mélanges en cuve avec des produits contenant le même principe actif, à moins que ces produits soient recommandés spécifiquement sur cette étiquette.

Dans certains cas, les produits de lutte antiparasitaire mélangés en cuve peuvent entraîner une activité biologique réduite ou des dommages accrus à la culture hôte. L'utilisateur devrait communiquer avec Syngenta Canada Inc. au 1-87-SYNGENTA / 1-877-964-3682 pour demander des renseignements avant d'appliquer tout mélange en cuve qui n'est pas recommandé spécifiquement sur cette étiquette.

Syngenta Canada Inc. n'a pas complètement évalué la performance (efficacité) et(ou) la tolérance des cultures (phytotoxicité) de tous les mélanges en cuves potentiels dans toutes les conditions environnementales ou pour toutes les variétés de cultures. Les mélanges qui ne sont pas expressément indiqués sur la présente étiquette doivent d'abord être testés sur une petite surface, dans des conditions locales et selon les pratiques standard, afin de confirmer qu'ils peuvent être utilisés sur toute la culture.

Pour vérifier la compatibilité physique de ce produit avec d'autres produits, effectuer un essai en bocal.

Toujours lire et suivre le mode d'emploi figurant sur l'étiquette des produits, y compris la séquence de mélange de WALES.

10.2 Application par voie terrestre

10.2.1 Renseignements généraux

Appliquer seulement lorsque le potentiel de dérive au-delà de la zone à traiter est minime. Prendre en considération la vitesse et la direction du vent, les inversions de température, la calibration de l'équipement d'application et du pulvérisateur.

Pour la protection des habitats non ciblés, éviter toute pulvérisation hors cible ou toute dérive vers un plan d'eau ou d'autres habitats vulnérables sur le plan environnemental. L'interaction entre de nombreux facteurs relatifs à l'équipement et à la température détermine le risque de

dérive du produit pulvérisé. Il revient au préposé à l'application de tenir compte de tous ces facteurs au moment de prendre des décisions concernant le traitement.

Application par pulvérisateur agricole: **NE PAS** appliquer lors de périodes de calme plat. Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales. **NE PAS** pulvériser en gouttelettes de taille inférieure au calibre moyen de la classification de l'American Society of Agricultural Engineers (ASAE S572.1). La hauteur de la rampe doit être de 60 cm ou moins au-dessus de la culture ou du sol.

On peut effectuer une application terrestre au moyen de tout pulvérisateur ordinaire à rampe.

NE PAS appliquer par voie aérienne.

10.2.2 Directives relatives au mélange

1. S'assurer que l'intérieur du pulvérisateur est propre, puis mettre la moitié de la quantité d'eau requise dans le réservoir et agiter doucement. Une bonne agitation est caractérisée par la présence de rides ou d'ondulations à la surface de l'eau.
2. Verser TRIMMIT et agiter jusqu'à ce que le mélange soit complet.
3. Mettre le reste de la quantité d'eau requise dans le réservoir du pulvérisateur et maintenir une bonne agitation.
4. Si la pulvérisation est interrompue, agiter vigoureusement avant de reprendre la pulvérisation.
5. Pulvériser le jour même du mélange.
6. Ne pas procéder au mélange ni au chargement du produit ni nettoyer l'équipement de pulvérisation aux endroits où il existe un risque de contamination des puits ou des systèmes aquatiques.

Lorsqu'on utilise de l'équipement de manutention des produits chimiques pour remplir le pulvérisateur, les recommandations supplémentaires suivantes s'appliquent.

- Les formulations SC peuvent être mélangées par induction ou par lot.

10.2.3 Directives relatives à la pulvérisation

1. Volume d'eau : Appliquer suffisamment d'eau pour assurer une couverture complète ; 400 à 800 L/ha sont recommandés.
2. Agitation dans le pulvérisateur : Utiliser un agitateur à jet ou un tube d'agitation hydraulique assurant la recirculation de 10 % ou plus du volume du réservoir à la minute. **NE PAS** utiliser de tube d'agitation pneumatique.
3. Pompe : Des tamis doivent être utilisés pour protéger la pompe et éviter toute obturation. Utiliser des tamis de 16 mailles ou *moins* du côté aspiration de la pompe. **NE PAS** installer de tamis sur le circuit de recirculation. Installer un tamis de 50 mailles ou *moins* entre la pompe et la rampe, à moins d'indication contraire de la part du fabricant du pulvérisateur.
4. Buses : Des buses à jet en éventail de 80 ou 110° limitant la dérive (p. ex. à préorifice ou à chambre de turbulence) ou des buses à injection d'air sont recommandées. Utiliser des tamis de buse de 50 mailles. **NE PAS** utiliser de buses à miroir, d'applicateur par gouttelettes contrôlées, de buses avec écran directionnel ni de buses à jet en cône creux.
5. Pression : Telle que recommandée par le fabricant des buses pour obtenir des gouttelettes de taille moyenne (classification de l'ASAE).

6. Appliquer à vitesse constante et éviter les chevauchements. Fermer l'alimentation de la rampe au moment du départ, des virages, des ralentissements ou des arrêts afin de ne pas endommager la culture par une application excessive.

10.2.4 Nettoyage de l'équipement

Avant la pulvérisation

- Avant d'utiliser TRIMMIT, s'assurer que le réservoir du pulvérisateur, les conduites et le filtre sont parfaitement propres.

Après la pulvérisation

- Pour éviter tout dommage subséquent à d'autres cultures, nettoyer à fond l'équipement de pulvérisation immédiatement après le traitement chaque jour.
- S'assurer que toute trace du produit est éliminée. **NE PAS** laisser de résidus sécher dans le réservoir du pulvérisateur. **NE PAS** laisser reposer la solution dans les conduites ou dans le réservoir durant la nuit. Les procédures suivantes sont recommandées :
 1. Vider le réservoir, la rampe et toutes les conduites, puis les laver pendant plusieurs minutes avec de l'eau propre. S'assurer que les conduites en cul-de-sac sont purgées. **Ne pas** nettoyer le pulvérisateur à proximité de végétaux que l'on désire conserver, d'un puits ou de toute autre source d'eau.
 2. Utiliser une laveuse haute pression pour nettoyer l'intérieur du réservoir. Bien laver toutes les parties du réservoir, y compris la partie supérieure de l'intérieur du réservoir. Si l'on ne dispose pas d'une laveuse haute pression, remplir complètement le réservoir du pulvérisateur avec la solution de nettoyage pour assurer un contact entre celle-ci et toutes les surfaces internes du réservoir et des conduites. Démarrer l'agitateur et faire recirculer la solution de nettoyage pendant au moins 15 minutes. L'équipement de pulvérisation ne doit présenter aucun dépôt visible.
 3. Rincer les conduits, les conduites de pulvérisation et les buses pendant au moins une minute avec la solution de nettoyage.
 4. Éliminer les rinçures conformément à la réglementation provinciale.
 5. Répéter les étapes 2 à 5.
 6. Enlever les buses, les tamis et les filtres et les nettoyer séparément dans la solution d'ammoniaque après avoir effectué les étapes ci-devant.
 7. Rincer le circuit de pulvérisation en entier avec de l'eau propre.

10.3 Zones tampons de pulvérisation

Une zone tampon de pulvérisation N'EST PAS requise pour: les utilisations faisant appel à un équipement d'application portatif permises sur la présente étiquette.

Les zones tampons de pulvérisation spécifiées dans le tableau ci-dessous sont requises entre le point d'application directe et la bordure sous le vent la plus rapprochée des habitats terrestres sensibles (tels que prairies, les zones forestières, les plantations brise-vent, les boisés, les haies, les zones riveraines et les arbustes) et des habitats d'eau douce sensibles (comme les lacs, les rivières, les marécages, les étangs, les fondrières des Prairies, les criques, les marais, les ruisseaux, les réservoirs et les terres humides).

Méthode d'application	Culture	Zones tampons de pulvérisation requises(en mètres) pour la protection d'un :				
		Habitats d'eau douce d'une profondeur de :		Habitat estuarien/marin d'une profondeur de:		Habitat terrestre
		Moins de 1 m	Plus de 1 m	Moins de 1 m	Plus de 1 m	
Pulvérisateur agricole	Gazon – allées, verts et tertres de départ des terrains de golf	2	1	0	0	5

Lorsque les mélanges en cuve sont permis, consulter l'étiquette des produits d'association et respecter la zone tampon de pulvérisation la plus grande (la plus restrictive) indiquée pour chacun des produits utilisés dans le mélange en cuve, puis appliquer en utilisant le calibre de gouttelettes le plus gros (selon la classification de l'ASAE) parmi ceux indiqués sur l'étiquette des produits d'association.

Il est possible de modifier les zones tampons de pulvérisation associées à ce produit selon les conditions météorologiques et la configuration du matériel de pulvérisation en utilisant le calculateur de zone tampon de pulvérisation dans la section Pesticides du site Canada.ca.

11.0 MODES D'EMPLOI SPÉCIFIQUES AUX CULTURES

11.1 Gazon – allées, verts et tertres de départ des terrains de golf

GAZON – allées, verts et tertres de départ des terrains de golf	
UTILISATIONS	Réduit la fréquence de tonte jusqu'à 50% en régulant la croissance du gazon. Répression de <i>Poa annua</i>
DOSE D'APPLICATION	Pour une seule application, appliquer à raison de 0,45 à 1,12 L/ha. Utiliser un taux plus faible et des applications plus fréquentes si la décoloration du gazon ne peut pas être tolérée. Pour des applications multiples, ne pas appliquer plus de 4,05 L/ha par année.
INTERVALLE ENTRE LES TRAITEMENTS	Pour maintenir un gazon de haute qualité, des applications répétées sont recommandées à un intervalle de 7 à 21 jours. Une application répétée peut être effectuée au cours de la même saison de croissance, tant que le gazon est en croissance active.

REMARQUES	<p>S'assurer que les doses sont mesurées avec précision, car des doses supérieures à celles recommandées peuvent entraîner une restriction indésirable de la croissance du gazon et peuvent occasionner une décoloration temporaire dans certaines zones.</p> <p>Appliquer dans une quantité d'eau suffisante pour assurer une couverture complète. Une quantité de bouillie de 400 à 800 L/ha est recommandée.</p> <p>Pour de meilleurs résultats, arroser le gazon après l'application de TRIMMIT, mais pas jusqu'au point de ruissellement, avant une pluie ou dans les 24 heures pour limiter les transferts en surface. Pour éviter que le produit ne ruisselle, effectuer le traitement à un moment où il sera possible d'effectuer un arrosage afin de permettre une absorption maximale dans le gazon avant qu'une pluie ne survienne.</p> <p>Pour une meilleure activité résiduelle, TRIMMIT doit être lavé de la surface des feuilles par irrigation ou par la pluie avant la tonde.</p> <p>Ne pas appliquer sur les grandes superficies de gazon qui ont été éclaircies par le drainage hivernal, les maladies ou les insectes jusqu'à ce que le repeuplement souhaité soit atteint.</p> <p>Retarder le traitement sur les gazons nouvellement ensemencés ou sur le gazon en plaque nouvellement installé jusqu'à ce que celui soit bien enraciné.</p> <p>Ne pas appliquer ce produit lorsque le sol est déjà saturé. Les fortes pluies ou l'irrigation des zones traitées peuvent provoquer le déplacement de la matière active sur les pentes et son accumulation dans les zones basses. Ces zones pourront être soumises à une régulation de la croissance plus importante pendant une plus longue période.</p> <p>Lorsqu'utilisé pour réprimer la croissance des graminées de saison fraîche Appliquer au printemps après le verdissement et lorsque le gazon a été tondu une ou deux fois. Appliquer au moins un mois avant l'arrivée des températures atmosphériques élevées. À la fin de l'été ou au début de l'automne, appliquer au moins un mois avant la date prévue de la première gelée meurtrière. Des applications répétées peuvent être effectuées au cours de la même saison de croissance, tant que le gazon est en croissance active. L'espèce de gazon et son stade de croissance doivent être pris en considération au moment d'établir la dose et le moment du traitement. Ne pas semer dans les six semaines précédant ou les deux semaines suivant l'application de TRIMMIT.</p> <p>Lorsqu'utilisé pour réprimer <i>Poa annua</i> Appliquer lorsque <i>Poa annua</i> est en croissance active. Dans les climats où la dormance d'hiver est prolongée, les applications d'automne peuvent être effectuées jusqu'à un mois avant la date prévue de la première gelée meurtrière. Les applications répétées doivent être effectuées dans le cadre d'un programme de répression de <i>Poa annua</i>. Le régulateur de croissance TRIMMIT aura un effet répressif sur la croissance et la compétitivité de <i>Poa annua</i>. On peut recourir à des doses plus faibles et à des applications plus fréquentes si la décoloration de <i>Poa annua</i> est problématique; cependant, la répression de <i>Poa annua</i> ne sera que modérée.</p> <p>Ne pas utiliser sur des zones contenant plus de 70 % de <i>Poa annua</i>, car la décoloration de <i>Poa annua</i> peut être inacceptable.</p>
------------------	---

Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser au représentant de l'entreprise au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682) ou à l'adresse www.syngenta.ca.

TRIMMIT^{MC} est une marque de commerce d'une compagnie du groupe Syngenta.